






الإسعافات الأولية

إعداد: آمنة الغوري

مدرسة معتمدة لدعم الحياة القلبي الوعائي المتقدم . ACLS







الأسباب:

1. الجو الجاف: الأجواء الجافة أو البيئات المغلقة التي تكون مُكَيِّفَة بالتدفئة قد تتسبب في جفاف ممرات الأنف، مما يؤدي إلى نزيف الأنف.
2. تنظيف الأنف: يمكن أن يسبب تنظيف الأنف بالإصبع بشكل متكرر إزعاجًا وإصابة طفيفة للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نزيف الأنف.
3. الحساسية الأنفية: قد تسبب الحساسية التهابًا في ممرات الأنف، مما يجعل الأوعية الدموية أكثر عرضة للنزيف.
4. الإصابة: الصدمات العرضية للأنف، أو السقوط، أو أي إصابة في الوجه قد تتسبب في نزيف الأنف عند الأطفال.
5. العدوى: بعض العدوى الفيروسية أو البكتيرية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو نزلات البرد العادية يمكن أن تؤدي إلى نزيف الأنف.

يحدث الاختناق عند دخول جسم إلى الحلق أو القصبة الهوائية يؤدي إلى سد مجرى الهواء. وعادةً ما يكون سبب إصابة البالغين به قطعة من الطعام. أما الأطفال الصغار، فكثيرًا ما يختنقون بأجسام صغيرة. الاختناق يهدد الحياة، فهو يقطع الأكسجين عن الدماغ. لذا يجب تقديم الإسعافات الأولية بأسرع ما يمكن عند تعرضك أنت أو شخص آخر للاختناق.

الاختناق

3



الاعماء

4

بلع اللسان

5

الخلاصة

10

نهاية المسار

11

التشنج

6

الاصابات

7

الجروح المفتوحة

8

الكسور

9

المقدمة

1

الرعاف


2


الاعغاء

4



حالات الاعغاء في المدارس قد تحصل لعدة أسباب منها عدم تناول وجبة الإفطار , ضربة الشمس , التعب و رؤية الدم الخ








وضعية المريض في حالة التشنج



التشنج 6







الكسر، باختصار هو تلف بتكامل العظم. يمكن رؤية الكسور عند الشباب بعض تعرضهم لاصابات مثل السقوط والحوادث، ويمكن رؤيته عند كبار السن المصابين بهشاشة العظام ذاتيا او نتيجة لاصابة صغيرة. الكسور تنقسم الى قسمين مفتوحة ومغلقة. في الكسور المغلقة يبقى العظم تحت الجلد، اما الكسور المفتوحة بسبب فالعظم يخترق الجلد الى الخارج بسبب الاصابة. وهي كسور أكثر خطورة بسبب خطر العدوى

